

1. Composición:

2,4 D 720 g/L
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid, Equivalente a 860 g/L en forma de sal dimetilamina por Litro de formulación a 20°C

2. Características del producto:

Familia química: Ácidos fenoxi-carboxílicos
Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente Peligroso
Usos: Herbicida
Código HRAC: Grupo O

3. Modo y mecanismo de acción:

AMINA TRUST 720 SL, es un herbicida sistémico, selectivo ideal para el control de malezas de hoja ancha en cultivo de caña de azúcar y potreros, afecta los procesos fisiológicos de la planta como respiración, fotosíntesis, absorción de nutrientes, división celular y la generación de ATP.

4. Equipo de aplicación:

Utilice equipos convencionales de aspersión.

5. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Maleza	Dosis
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Batatilla (<i>Ipomoea congesta</i>) Escoba (<i>Sida acuta</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Viernes santo (<i>Phyllanthus niruri</i>) Yerba de sapo (<i>Euphorbia hirta</i>) Uchuva (<i>Physalis angulata</i>)	3 L/ha
Potreros	Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Emilia (<i>Emilia sonchifolia</i>) Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>), Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>) Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	2 L/ha
Arroz	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>) Yerba de sapo (<i>Euphorbia hirta</i>) Hierba de chivo (<i>Ageratum conyzoides</i>) Pega-pega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Tabaquillo (<i>Emilia sonchifolia</i>)	1.3 L/ha

6. Intervalo de aplicación:

Debe ser aplicado en postemergencia temprana del cultivo, tratando de no mojar los cogollos de la planta de caña. En potreros y arroz hacer una aplicación dirigida a las malezas.

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

15 días

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

12 horas

9. Fitotoxicidad:

AMINA TRUST 720 SL, no es fitotóxico al cultivo si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta. Es recomendable dejar un periodo de 30 días después de la aplicación para sembrar cultivos susceptibles. Es muy importante evitar que la deriva de aplicación llegue a cultivos susceptibles cercanos.

10. Compatibilidad:

AMINA TRUST 720 SL, no es fitotóxico al cultivo si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta. Es recomendable dejar un periodo de 30 días después de la aplicación para sembrar cultivos susceptibles. Es muy importante evitar que la deriva de aplicación llegue a cultivos susceptibles cercanos.

11. Registro de Venta ICA:

Registro Nacional ICA 1117