

### 1. Composición:

Metsulfuron metil ..... 600 g/kg  
2-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid, de formulación a 20° C

### 2. Características del producto:

Familia química: Sulfonilureas  
Clasificación toxicológica (OMS): III Ligeramente Peligroso  
Usos: Herbicida  
Código HRAC: Grupo B

### 3. Modo y mecanismo de acción:

Es un herbicida para ser mezclado con agua y aplicado en aspersion total sobre el cultivo y malezas para el control selectivo de malezas de hoja ancha, en los cultivos de arroz y potreros. Su mecanismo de acción es a través de la Inhibición de ALS (Acetolactato sintetasa).

### 4. Equipo de aplicación:

Puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre.

### 6. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

| Cultivo  | Maleza   | Dosis                    |
|----------|--|--------------------------|
| Arroz    | Batatilla ( <i>Ipomoea hirta</i> ), Clavito ( <i>Jussiaea linnifolia</i> ), Bledo ( <i>Amaranthus dubius</i> ), Botón blanco ( <i>Eclipta alba</i> ), Chilinchil ( <i>Cassia tora</i> ), Pegapega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), Palo de agua ( <i>Amaina coccinea</i> ), Dormidera ( <i>Mimosa sp</i> ), Piñita ( <i>Murdania nudiflora</i> ), Tripa de pollo - lechosa ( <i>Euphorbia hirta</i> ), Suelda con suelda ( <i>Commelina difusa</i> )   | 15 Kg/ha                 |
| Potreros | Chilinchil ( <i>Cassia tora</i> ), Bledo ( <i>Amaranthus dubius</i> ), Dormidera ( <i>Mimosa pigra</i> ), Hierba de polla ( <i>Commelina difusa</i> ), Masiquia ( <i>Bidens pilosa</i> ), Botoncillo ( <i>Eclipsa alba</i> ), Batatilla ( <i>Ipomoea sp</i> ), Cundeamor ( <i>Momordica charantia</i> ), Pegapega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), Venturosa ( <i>Lantana camara</i> ), Clavito ( <i>Jussiaea linnifolia</i> ), Tripa de pollo ( <i>Euphorbia hirta</i> ), Mortiño ( <i>Clidemia hirta</i> ), Escoba ( <i>Sida rhombifolia</i> ), Rabo de ratón ( <i>Achyranthes indica</i> ). | 1.5 -3 g/20L             |
| Potreros | Helechos ( <i>Pteridium aquilinum</i> )  | 3.0 g/20 L para helechos |

**8. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:**

Arroz: 30 días

Potrerros: No aplica.

**9. Intervalo de reingreso al área tratada:**

6 horas

**10. Fitotoxicidad:**

Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de la etiqueta, no se han observado síntomas de fitotoxicidad. Puede generar fitotoxicidad en cultivos sucesivos.

**11. Compatibilidad:**

Las mezclas con insecticidas organofosforados pueden producir daño el cultivo.

**12. Registro de Venta ICA:**

Registro Nacional ICA 320

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.

Versión 03. 2020