

1. Composición:

Picloram.....	64 g/L
Acido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico, de formulación a 20° C equivalentes a 114,7 g/L en forma de Sal triisopropanolamina.	
2,4-D.....	240 g/L
Acido 2,4-diclorofenoxiacético, de formulación a 20° C equivalentes a 447,7 g/L en forma de Sal triisopropanolamina.	

2. Características del producto:

Familia química: Ácidos Fenoxi-Carboxílicos y Piridina
 Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente tóxico
 Usos: Herbicida
 Código HRAC: Grupo O

3. Modo y mecanismo de acción:

Es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas que crece en potreros. Cuenta con dos ingredientes activos que actúan a través de Ácido piridino – carboxílico y Ácido fenoxi carboxílico.

4. Equipo de aplicación:

Utilice equipos convencionales de aspersión. Para el caso de taconeo aplique con brocha o bomba de espalda.

5. Forma de preparación de la mezcla:

Aplique en forma de aspersión mezclado con agua. No se mezcle con aceite o ACPM. Para obtener mejores resultados aplique RANCHERO® 101 SL cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, condiciones que se presentan cuando se ha establecido el periodo de lluvias o cuando existe suficiente humedad en el suelo.

6. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Maleza	Dosis
Potreros	Potreros localizado (Malezas en manchones o diseminadas)	(0.25%-1.0%) 100 l de agua ha
	Malezas herbáceas anuales:	0.25%-0.5%
	Potreros malezas semileñosas y leñosas	0.5%-1.0%
	Potreros malezas leñosas	1.0%
	Potreros taconeos: Para malezas leñosas con troncos y cepas resistentes. Corte el tronco o haga heridas superpuestas. Aplique con brocha o bomba de espalda sobre el corte fresco hasta lograr escurrimiento. Este tratamiento puede llevarse a cabo en época de lluvia o sequía.	3.0-4.0 l 100 l agua ha

Malezas herbáceas anuales: Bicho o Chilinchil (*Cassia tora*), Bledo (*Amaranthus spp.*), Dormidera (*Mimosa pudica*); Rabo de alacrán (*Heliotropium indicum*), Alcanforada (*Hyptis suaveolens*); Cafecillo (*Cassia occidentalis*); Pata de tórtola (*Croton hirtus*).

Malezas semileñosas y leñosas: Lengua de vaca (*Rumex conglomeratus*); Escoba blanca (*Melochia parviflora*); Verbena (*Stachytarpheta cayennensis*); Hierba de polla (*Commelina difusa*); Masiquia (*Bidens pilosa*); Botoncillo (*Eclipsa alba*); Batatilla (*Ipomoea sp*); Cundeamor (*Momordica charantia*); Pega pega (*Desmodium tortuosum*); Verdolaga (*Portulaca oleracea*); Arvejón (*Vicia tetrasperma*); Venturosa (*Lantana camara*); Cenizo (*Chenopodium album*); Gualola o barbasco (*Poligonum hydropiperoides*); Nabo (*Brassica sp*); Bolsa de pastor (*Capsela bursa pastoris*); Malva (*Malachra alceifolia*); Bocachica (*Thalia geniculata*); Melochia (*Melochia lupulina*).

Malezas leñosas: Zarza (*Mimosa pigra*)*; Pata de vaca (*Bauhinia pauletia*, *Bauhinia divaricata*)*; Escoba dura (*Sida spp.*); Espino, pintamono o payandé (*Pithecolobium lanceolatum*, *P. hymenaefolium*)*; Capote (*Machaerium capote*)*; chaparro (*Mirospermum frutescens*)*; Bálsamo Cactus (*Opuntia sp.*)*; Guamacho (*Feriskia sp.*)*; Granizo (*Cenecio sp.*)*; Guásimo (*Guazuma tomentosa*)*; Mata-ratón (*Glyricidia sepium*)*; Manito pilón (*Miros sp.*); Mosquero (*Croton leptostachyus*); Pelá (*Acacia fameciana*)*; Quebrahacha (*Stronium sp.*)*; Uvito (*Cordia dentata*)*; Canalete (*Cordia toquere*)*.

* Utilice el sistema de toconeo cuando la maleza venga de rebrote.

7. Intervalo de aplicación:

En aplicaciones foliares, utilice las dosis más bajas del rango para malezas en estado temprano de crecimiento y las dosis más altas para malezas en estado avanzado de crecimiento.

8. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

No aplica.

9. Intervalo de reingreso al área tratada:

24 horas

10. Fitotoxicidad:

No es fitotóxico bajo las recomendaciones de dadas en la etiqueta.

11. Compatibilidad:

Se recomienda hacer pruebas previas a la mezcla.

12. Registro de Venta ICA:

Registro de venta ICA 392

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.

Versión 03. 2020