

1. Composición:

Cipermetrina.....	72 g/L
Acetamiprid.....	16 g/L

de formulación a 20° C.

2. Características del producto:

Familia química: Piretroides y Neonicotinoides

Clasificación toxicológica (OMS): II MODERADAMENTE PELIGROSO

Usos: Insecticida

Código IRAC: Cipermetrina Grupo 3A. Moduladores de los canales de sodio

Acetamiprid Grupo 4A. Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina

3. Modo y mecanismo de acción:

Es un insecticida, formulado con un neonicotinoide (Acetamiprid) y un piretroide (Cipermetrina) de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. El ingrediente activo Acetamiprid en plantas es sistémico y translaminar con movimiento acropetal, mientras Cipermetrina actúa sobre el insecto por contacto.

4. Equipo de aplicación:

Use equipos convencionales de aspersión foliar.

5. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Plaga	Dosis
Arroz	Gusano Cogolero (<i>Spodoptera frugiperla</i>)	500 ml/ha
Arroz	Chinche (<i>Oebalus spp</i>)	550 ml/ha
Cebolla	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	550 ml/ha
Papa	Pulguilla (<i>Epitrix cucumeris</i>)	500 ml/ha
Maíz	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperla</i>)	700 ml/ha
Tomate	Gusano Cogollero (<i>Tuta Absoluta</i>)	700 ml/ha

6. Intervalo de aplicación:

En arroz para Chinche, hacer una aplicación con los primeros ataques de la plaga, para gusano cogollero hacer una aplicación cuando se supere dos larvas por pase de jama. En cebolla hacer una aplicación iniciando cuando se presenten dos individuos por planta. En papa aplicar una vez cuando se presenten 2 individuos por dos pases dobles de jama, en Tomate, hacer una aplicación para Cogollero con móviles superiores al 5% de brotes infestados con huevos y/o larvas vivas, en Maíz una aplicación sobre instares larvales L1 a L2 con aplicación dirigida a toda la planta. Consulte con el ingeniero agrónomo.

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

Arroz, Cebolla, maíz, papa y tomate: 10 días.

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

4 horas

9. Fitotoxicidad:

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

10. Compatibilidad:

Se recomienda hacer siempre pruebas de compatibilidad a pequeña escala, antes de mezclar con otros plaguicidas.

11. Registro de Venta ICA:

Registro Nacional ICA 3162

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
Versión 03. 2022