ABAMEX

INSECTICIDAS
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN
ABAMECTINA 18 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
FAMILIA QUÍMICA	Avermectinas
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	6

MODO DE ACCIÓN
ABAMECTINA® 1.8 EC es un producto natural derivado de microorganismos del suelo, (Streptomices avermectitilis). Recomendado para el control de plagas en diversos cultivos, de amplio espectro y acción prolongada. Debe ser aplicado como una fumigación foliar, cuando los ácaros o minas inician su aparición. Para obtener óptimos resultados es necesario un cubrimiento completo de todas las superficies de la planta, sin embargo, debe evitar un escurrimiento.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS				
CULTIVO	**PLAGA**	**DOSIS**	**P.C. días**	***P.R. (horas)**
Crisantemo, Gyosiphila	Minadores ***Liriomyza huidobrensis*** ***Liriomyza trifolii***	0.25 – 0.30ml/L de agua, aplique cuando inicie la aparición de adultos	N.A.	4
Rosas	Ácaros ***Tetranychus urticae***	0.30 – 0.35ml/L de agua	N.A.	4
Cebolla cabezona	Minadores ***Liriomyza huidobrensis***	Aplicar 700 – 1.000ml/ha cuando inicie la aparición de adultos	7	4

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.
***P.C.: Periodo de carencia:** Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.
N.A.: No aplica

PRESENTACIONES
1 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.