BAZUKA

INSECTICIDAS
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN
LAMBDA CIHALOTRINA 50 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
FAMILIA QUÍMICA	Piretroide
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	3A

MODO DE ACCIÓN
BAZUKA® 50 EC es un insecticida del grupo químico de los piretroides que ofrece un rápido efecto de choque sobre las plagas sensibles, afectando su sistema nervioso, impidiendo la transmisión efectiva del impulso nervioso, ocasionando en los insectos pérdida de control sobre los movimientos voluntarios e involuntarios, **BAZUKA® 50 EC**, produce una rápida parálisis de los insectos que desencadena en su muerte.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS					
CULTIVO	**PLAGA**	**DOSIS L/ha**	**Epoca y frecuencia de aplicación**	***P.C.**	***P.R.**
Algodonero	Gusano bellotero ***Heliothis virescens***	0.5 – 0.85	Aplicar cuando haya entre 15 – 20% de larvas pequeñas en terminales o el mismo porcentaje de daño fresco en botones florales.	30	4
	Picudo ***Anthonomus grandis***	0.5			
Arroz	Cucarro ***Eutheola bidentata***	0.25	Aplicar a los 8 a 20 días después de germinado el cultivo	30	4
	Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda***	0.5	Aplicar cuando se presenten hasta 10 larvas/m.		
	Marranita ***Neocutilla hexadactyla***	0.35	Aplicar 10 días después de la germinación con 5% de plantas trozadas		
Papa	Pulguilla ***Epitrix sp***	0.5	Disuelto en 300 – 400 litros de agua	7	4
	Minador de la hoja ***Lyriomyza quadrata***	0.6 – 0.8	Aplicar al aparecer los síntomas de daño en las plantas observadas. Repetir la aplicación con base en monitoreo de cultivo y plaga.		
Cebolla de bulbo	Trips ***Thrips tabaci***	0.4 – 0.5	Aplicar con un nivel mayor a 2 insectos/planta. Repetir con base en monitoreo del cultivo y plaga.	30	4
Sorgo	Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda***	0.6	Disuelto en 150 – 300L de agua. Aplicar por vía terrestre.	30	4
Pastos	Chinche de los pastos ***Collaria columbiensis***	0.5	Aplicar una sola vez con una población de 10 individuos por 10 pases dobles de jama	30	4
Flores (Rosas – claveles)	Arañita roja ***Tetranychus urticae***	0.5ml/L de agua	Hacer aplicación con base a monitoreo de plaga.	30	4

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al

área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.
***P.C.: Periodo de carencia:** Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.
N.A.: No aplica

PRESENTACIONES
1 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.