

DISTROM 22.2 SC

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

ACETAMIPRID 77 g/L / INDOXACARB 145 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	NEONICOTINOIDE, OXADIAZINA
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	Acetamiprid: 4A Indoxacarb: 22A

MODO DE ACCIÓN

DISTROM® 22.2 SC es un insecticida de uso foliar, con acción por ingestión y por contacto. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. Su ingrediente activo Acetamiprid se une al sitio de la acetilcolina en el receptor, provocando la hiperexcitación, letargia y parálisis de los insectos. Su ingrediente activo Indoxacarb bloquea los canales de sodio, causando parálisis y cese del movimiento y la alimentación de los insectos.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	LMR (mg/kg)	P.C. días	*P.R. (horas)
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Cogollero Tuta absoluta	0.5L/ha	Acetamiprid: 0.2mg/ka Indoxacarb: 0.5mg/kg	0	4 horas

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.

***P.C.: Periodo de carencia:** Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.

***LMR.: Límite máximo de residuo**

N.A.: No aplica

PRESENTACIONES

1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.