

EUREKA 60 WG

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

METSULFURON METIL 600 g/kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	SULFONYLUREAS
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	2, GRUPO B

MODO DE ACCIÓN

EUREKA® 60 WG es un herbicida para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión total sobre el cultivo y malezas para el control selectivo de malezas de hoja ancha, en los cultivos de arroz y potreros. Puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre.

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	PRECAUCIONES DE APLICACIÓN	P.C. (días)	P.R. (horas)
Arroz	Batatilla (<i>Ipomoea hirta</i>) Clavito (<i>Jussiaea linnifolia</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Botón blanco (<i>Eclipta alba</i>) Chilinchil (<i>Cassia tora</i>) Pegapega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Palo de agua (<i>Amaina coccinea</i>) Dormidera (<i>Mimosa sp</i>) Piñita (<i>Murdania nudiflora</i>) Tripa de pollo - lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>) Suelta con suelta (<i>Commelina difusa</i>)	15g/ha	Post-emergencia total: Aplique desde 15 días (4-5 hojas) hasta 35 días de la emergencia del cultivo. Las malezas deben tener hasta 7 hojas (10-15 cm. de altura). Por ningún motivo aplique después de los 35 días porque las estructuras de reproducción de arroz son muy susceptibles y se puede causar un daño severo al cultivo.	30	4
Potreros	Chilinchil (<i>Cassia tora</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Dormidera (<i>Mimosa pigra</i>) Hierba de polla (<i>Commelina difusa</i>) Masiquia (<i>Bidens pilosa</i>) Botoncillo (<i>Eclipsa alba</i>) Batatilla (<i>Ipomoea sp</i>) Cundeamor (<i>Momordica charantia</i>) Pegapega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Venturosa (<i>Lantana camara</i>) Clavito (<i>Jussiaea linnifolia</i>) Tripa de pollo (<i>Euphorbia hirta</i>) Mortño (<i>Clidemia hirta</i>) Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>) Rabo de ratón (<i>Achyranthes indica</i>)	1.5 – 3.0g/20L	En pastos dedicados a la obtención de semilla, aplique EUREKA® 60 WG antes del inicio del primordio floral, porque puede producir daño a la semilla.	N.A.	4
	Helechos (<i>Pteridium aquilinum</i>)	3.0g/20L	Debido a la consistencia cerosa y lisa del helecho se hace necesaria la adición de un surfactante para mejorar la adherencia /penetración del producto.		

*P.R.: Periodo de reentrada *P.C.: Periodo de carencia *N.A.: No aplica

PRESENTACIONES

20g, 100g, 1kg

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.