

FORDAZIM

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN	
CARBENDAZIM	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
FAMILIA QUÍMICA	BENZIMIDAZOL
USOS	FUNGICIDA
CATEGORÍA FRAC	1

MODO DE ACCIÓN
FORDAZIM® 500 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción preventiva y curativa. Es absorbido por las raíces y tejidos verdes de la planta, y translocado vía xilema de forma acropetal. Actúa inhibiendo la síntesis de tubulina, impidiendo así la formación de microtubulos mitóticos (huso acromático) y la división celular durante la reproducción del hongo. Como resultado, FORDAZIM® 500 SC inhibe el crecimiento de micelios.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS				
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C. días	*P.R. horas
Sorgo	Complejo fungoso (<i>Colletotrichum sp</i>), (<i>Penicillium sp</i>), (<i>Alternaria sp</i>), (<i>Cladosporium sp</i>), (<i>Drechslera sp</i>), (<i>Gibberella sp</i>)	500 ml/ha solo o en mezcla con 1.000 ml de azufre 720 g/L. Aplicación vía terrestre: en un volumen de 200 L de agua. Epoca de aplicación: 1. a los 40 DDG*(embuchamiento) 2. a los 80 DDG (floración). DDG* días después de germinado.	10	4
Arroz	Piricularia (<i>Pyricularia grisea</i>)	400-600 ml/ha	10	4
	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500 m/ha Aplicación temprana: Durante el macollamiento (aprox.35 DDG) Aplicación tardía: Durante el embucamiento (aprox.75 DDG)	15	4
Banano	Sigatoka (<i>Mycosphaerella musicola</i>)	300-600 ml/ha	7	4
Café	Antracnosis (<i>Colletotrichum coffeanum</i>)	120-160 ml/ha	10	4
	Mancha de hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>) Gotera: (<i>Mycena citricolor</i>) Muerte descendente: (<i>Phoma sp</i>)			

Melón	Oidium (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	60-80 ml/100 L de agua	10	4
	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)			
	Botrytis (<i>Botrytis sp</i>)			
Piña	Pudrición de las hojas (<i>Thielaviopsis paradoxa</i>)	30-60 ml/100 L de agua	15	4
Cacao	Moniliasis (<i>Moniliophthora rorei</i>)	60-80 ml/100 L de agua	15	4
Yuca	Mancha de las hojas (<i>Cercospora sp</i>)	60-80 ml/100 L de agua	15	4
Mango	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	500 ml/ha. Epoca de aplicación al momento de la floración y después a los 8-15 días.	7	4
Fresa	Pudrición del fruto (<i>Botrytis cinérea</i>)	70-120 ml/100 L de agua	14	4
Tomate	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	80 ml/200 L de agua	7	4
Arveja	Pecoseo o nevada (<i>Ascochyta sp</i>)	300-500 ml/ha	7	4
*USO ORNAMENTALES				
Rosa <i>Rosa</i>	Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 ml/L de agua	N.A.	4

*P.C. Periodo carencia N.A. No Aplica *P.R. Periodo reentrada

*Se efectuaron pruebas de fitotóxicidad con el producto FORDAZIM® 500 SC EC en los cultivos de: Pompón (*Dahlia spp*) y Clavel (*Dianthus caryophyllus L*)

PRESENTACIONES

1L, 4L, 20L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO®.