

FOSTER

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PROPICONAZOLE 250g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	TRIAZOLES
USOS	FUNGICIDA
CATEGORÍA FRAC	Grupo G

MODO DE ACCIÓN

FOSTER® 250 EC es un fungicida foliar de amplio espectro con acción sistémica y residual. La sustancia activa es absorbida rápidamente por las partes de la planta que intervienen en el proceso de asimilación y es transportado en forma acropetala (ascendente). Este movimiento sistémico asegura su distribución dentro de la planta y evita que la sustancia activa sea lavada por efecto de las lluvias o la irrigación.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C. días	*P.R. horas
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Manchado del grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Rhynchosprium oryzae</i> , <i>Curvularia lunata</i>)	0.5L/ha	30	4
Banano <i>Musa paradisiaca</i>	Sigatoka negra (<i>Micosphaerella fijiensis var diformis</i>)	0.4L/ha	1	4

*P.C. Periodo carencia *P.R. Periodo reentrada

PRESENTACIONES

1L, 4L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.