

PENDIMETALINA TRUST 400 EC

HERBICIDAS
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PENDIMETALINA 400g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	Dinitroanilina
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	3

MODO DE ACCIÓN

PENDIMETALINA TRUST® 400 EC es un herbicida residual que controla las malezas antes de la emergencia del suelo. controlará las malezas en proceso de germinación por periodo de 4 o 6 semanas después de la aplicación. El mecanismo de acción de Pendimetalina es a través de la Inhibición del ensamble del microtúbulo.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS

CULTIVO	MALEZAS	LIVIANO L/ha	MEDIANO L/ha	PESADO L/ha	RECOMENDACIONES
Maíz	Gramíneas: Cadillo (<i>Cenchrus browni</i>), Guardarroco (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Cola de pavo, Cola de zorro (<i>Andropogon bicornis</i>)	2.0 – 2.5	2.9 – 3.3	3.7 – 4.1	PREEMERGENCIA (PRE). Aplíquese antes de que emerjan el maíz y las malezas en suelos bien preparados libres de vegetación y residuos vegetales y con buena humedad.
Soya	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Pasto Jonson (<i>Sorghum halepense</i>). Hoja ancha: Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Viernes santo (<i>Phyllanthus niruri</i>)	2.0 – 2.5	2.9 – 3.3	3.7 – 4.1	PREEMERGENCIA (PRE), Aplíquese en pre-emergencia total dentro de las 24 horas siguientes a la siembra.

Soya		2.5	2.9	3.3	PRESIEMBRA Incorporado (PSI) incorporarlo durante la misma semana de aplicación de 5 - 8 centímetros de profundidad, mediante el paso cruzado de rastra de disco u otro implemento que lo mezcle bien con el suelo.
Sorgo			2.5 – 3.3		POSTEMERGENCIA temprana (POST), Aplíquese cuando el cultivo tenga de tres a cuatro hojas, 10 cm de altura y las malezas de una a dos hojas en suelo con buena humedad. Aplicaciones hechas cuando el sorgo tiene menos de 3 hojas pueden resultar fitotóxicas al cultivo.
Algodonero		2.9 – 2.9	2.9 – 3.3	3.7 – 4.1	PRESIEMBRA Incorporado (PSI) Incorporarlo en la misma semana de aplicación de 5-8 cm de profundidad, mediante el paso cruzado de rastra de disco y otro implemento que lo mezcle bien con el suelo.
Algodonero		2.5	2.9	2.9	PREEMERGENCIA (PRE) Aplíquese en preemergencia total dentro de las 24 horas después de la siembra. EL PRODUCTO NO DEBE SER APLICADO 24 HORAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA.

Tabaco rubio		2.9			PREEMERGENCIA (PRE) a las malezas y Pre-transplante (PRE-T) al cultivo después de los caballones. Solo usarse en suelos arenosos. Aplicación Post (Véase información detallada en otro aparte de esta etiqueta).
Arroz			4.1		PREEMERGENCIA (PRE) aplicar a los 2 días después de realizado el moje de germinación.
Cebolla de bulbo		2.5	3.3	4.1	Aplíquese en preemergencia a malezas, post transplante al cultivo.
Tomate		2.5	2.9	3.3	Aplíquese en preemergencia a las malezas y pre-transplante de cultivo.
Café		825ml de PENDIMETALINA TRUST 400 EC / 100L de agua			Aplíquese en preemergencia a las malezas dirigida hacia el plato del árbol.

Plátano		825 ml de PENDIMETALINA TRUST 400 EC/100 L agua	Aplíquese en preemergencia a las malezas dirigida hacia la zona del plato de la planta.
---------	--	--	--

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.