

KORZY 15 SC

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

CHLORANTRANILIPROLE 100 g/L / LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	DIAMIDA, PIRETROIDE
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	Chlorantraniliprole: 28 Lambda-Cyhalothrin: 3A

MODO DE ACCIÓN

KORZY® 15 SC es un insecticida de uso foliar, de amplio espectro con acción por ingestión y por contacto. Actúa sobre el sistema nervioso y muscular de los insectos. Su ingrediente activo Chlorantraniliprole activa los receptores musculares de la rianodina, lo que provoca contracción y parálisis, y en última instancia, la muerte de los insectos. Su ingrediente activo Lambda-cyhalothrin mantiene abiertos los canales de sodio, lo que causa hiperexcitación y, en algunos casos, bloqueo nervioso de los insectos.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	LMR (mg/kg)	P.C. días	*P.R. (horas)
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	100 – 125ml/ha	Chlorantraniliprole: 0.01 Lambda-cyhalothrin: 0.02	N.A.	4 horas

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.

***P.C.: Periodo de carencia:** Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.

***LMR.: Límite máximo de residuo**

N.A.: No aplica

PRESENTACIONES

1 L, 500ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.