KLOISTER 10 SC

INSECTICIDAS
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN
CHLORFENAPYR 70 g/L / BIFENTHRIN 30 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	
FAMILIA QUÍMICA	PIRROL, PIRETROIDE
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	Chlorfenapyr: 13 Bifenthrin: 3A

MODO DE ACCIÓN
KLOISTER® 10 SC es un insecticida de uso foliar, de amplio espectro, que actúa por ingestión y por contacto. Su ingrediente activo Chlorfenapyr actúa sobre el sistema respiratorio de los insectos al causar un corto circuito en el gradiente de protones mitocondrial para que no se pueda sintetizar ATP. Su ingrediente activo Bifenthrin actúa sobre el sistema nervioso de los insectos al mantener abiertos los canales de sodio, causando hiperexcitación y, en algunos casos, bloqueo nervioso.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS					
CULTIVO	**PLAGA**	**DOSIS**	**LMR (mg/kg)**	**P.C. días**	***P.R. (horas)**
Pastos	*Empoasca spp*	0.3L/ha	N.A.	30	4 horas

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.
***P.C.: Periodo de carencia:** Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.
***LMR.:** Límite máximo de residuo
N.A.: No aplica

PRESENTACIONES
1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.

Fecha de emisión: 17/07/2025
Registro ICA N° PL0001682025